



VETCO[®]
ENTERPRISES (PVT.) LTD.

★★★★ *An Animal Caring Company* ★★★★★



Manufactured by:
D-Haans Pharma (Pvt.) Ltd.

Plot # 9/A, Industrial Estate Bhimber
Azad Kashmir. Contact: 0306-5632000

- Flat # 6, 2nd Floor, United Center,
Murree Road, Shamsabad, Rawalpindi-Pakistan.
- 051-4935019 ■ +92 301 8657525 ● +92 323 4441525
- Vetcopk1525@gmail.com



An Animal Caring Company

Sunro-E

Oral Liquid

سنرو-ای

اورل لیکویڈ

Composition:

Each 100ml contains:

Enrofloxacin 20gm

Colistin Sulphate 3%

(As per Innovator's Specification)



INDICATIONS:

Sunro-E is indicated for Early chick mortality, Yolk infection, Colibacillosis (E.Coli), Chronic respiratory diseases (CRD), Complex chronic respiratory diseases (CCRD), Infectious Coryza, Pasteurellosis, Mycoplasmosis, Staphylococcus, salmonellosis, and infections associated with viral diseases.

DOSAGE:

Preventive: 1ml / 6 liter drinking water for 3 to 5 days.

Treatment: 1ml / 4 liter drinking water for 3 to 5 days.

علامات:

مرغیوں میں ابتدائی اموات، زردی کی نقلش، سی آر ڈی، سی سی آر ڈی، ایکولائی، ٹائیفیڈ، کالرہ، سالمونیلہ، اومفلانٹس کورائزہ، گرام مثبت، گرام منفی، سٹیفلوکوکس اور مائیکوپلازمہ سے پیدا شدہ بیماریوں کے لئے مفید ہے۔

طریقہ استعمال: (پولٹری)

احتیاطی خوراک:

1 ملی لیٹر 6 لیٹر پانی میں 3 سے 5 دن تک دیں۔

بطور علاج:

1 ملی لیٹر 4 لیٹر پانی میں 3 سے 5 دن تک دیں۔



VETCO

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

GUNAXIN-AE

Oral Liquid

گونیکزین۔ اے ای

اورل لیکویڈ

COMPOSITION:

Each 100 ml contains:

- Enrofloxacin.....10 gm
 - Guaifenesin.....4 gm
 - Aminophylline10 gm
- (As per Innovator's Specification)



INDICATIONS:

Gunaxin-AE: is indicated for the treatment and control of C.R.D (Mycoplasma), CCRD, Salmonella spp. E.Coli, Coryza, Fowl Cholera, Stephylococcus spp. And secondary bacterial complications of virus infections.

DOSAGE:

For Poultry:

- Preventive: 1 ml per 4 liters drinking water for 3 to 5 days.
- Treatment: 1 ml per 2 liters drinking water for 3 to 5 days.



استعمال پوٹری:

مرغیوں میں گلے کی سوزش، بلغم، انتڑیوں کی سوزش، مائیکوپلازما، آئی بی (سی آر ڈی، سی ای آر ڈی) ایکولائی، فاؤل کارلر، فاؤل ٹائیفائیڈ (سالمونیلہ) اور دیگر امراض کیلئے موثر دوا ہے۔

خوراک: مرغیوں کیلئے

احتیاطی خوراک:

1 ملی لیٹر 4 لیٹر پانی میں 3 سے 5 دن تک دیں۔

بطور علاج:

1 ملی لیٹر 2 لیٹر پانی میں 3 سے 5 دن تک دیں۔



ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

CRD Haans-66

W/S Powder

COMPOSITION:

Each 100gm contains:

Doxycycline HCl20 gm

Tylosin Tartrate10 gm

Colistin Sulphate3gm


Bromhexine HCl 1.0 gm

(As per Innovator's Specification) **INDICATIONS:**

It is indicated for the treatment and prevention of C.R.D, C.C.R.D., Fowl Cholera, Bacterial enteritis, Early chick mortality. In large animals infection caused by Tylosin, Doxycycline and Colistin sensitive micro-organisms. It can be used in calves, especially in case of the gastrointestinal and respiratory tract infections.

سی آر ڈی ہانس-66

پانی میں حل پذیر پاؤڈر



®

VETCO

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry:

BERACIN-H

W/S Powder

بیراسین-ایچ

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

COMPOSITION:

Each 100gm contains:

Calcium Fosfomycin 20gm Tylosin Tartrate
..... 5gm Fructose 1,6 Diphosphate.....
18gm Sodium Phosphate 15gm Magnesium
Phosphate 10gm

(As per Innovator's Specification)

Preventive: 1 gm per 4 liters of drinking water
for 3-5 days.

Treatment: 1 gm per 2 liters of drinking water
for 3-5 days.

Cattle & Sheeps: 100gm per 80 calves of 50kg
body weight each for 3-5 days.

علامات:

سی آر ڈی ہانس۔ 66 چوزوں میں نظام انہضام سی۔ آر۔ ڈی،
سی۔ سی۔ آر۔ ڈی، فاول کارہ، فاول ٹائیفائیڈ اور بیکٹیریل اینٹرائٹس،
کے روک تھام اور علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے

خوراک و استعمال:

پولٹری:

احتیاطی خوراک:


1 گرام فی 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک دیں۔

بطور علاج:

1 گرام فی 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک دیں۔

مویشی اور بھیڑ بکری:

1 گرام 10 کلو جسمانی وزن کے حساب سے استعمال کریں۔



®

VETCO

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

INDICATIONS:

Beracin-H is used for the prevention and treatment of bacterial infections in poultry, including infections of the respiratory, digestive tracts, articular infections, e.g. Pasteurellosis, Salmonellosis, Colibacillosis, CRD Complex,

FLOHANS-20 %

Coryza, Staphylococcosis, Listeriosis, Dysentery, Diarrhoea & Mycoplasma

DOSAGE:

Preventive: 1 gram Beracin-H per 10kg body weight in drinking water for 3-7 days use.

Treatment: 1 gram Beracin-H per 6.25kg body weight in drinking water for 3-7 days use.

علامات:

پیراسین ایچ ہر طرح کی متعدی بیماریوں اور ان سے پیدا شدہ پیچیدگیوں کے کئے بے حد مفید ہے

طریقہ استعمال:

احتیاطی خوراک:

1 گرام فی 10 کلوگرام بحساب

جسمانی وزن صاف پانی میں حل کر کے 3-7 دن استعمال کروائیں۔

بطور علاج:

1 گرام فی 6.25 کلوگرام بحساب

جسمانی وزن صاف پانی میں حل کر کے 3-7 دن استعمال کروائیں۔



®

VETCO

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

فلوہانس-20%

اورل لیکویڈ

Composition:

Each 100ml Contains: Oral Liquid

Florfenicol20g

(As per Innovator's Specification)

Indications:

Flohans 20% has strong efficacy against bacteria like E.Coli, Salmonella, Haemophilus species, staphylococcus, species, streptococcus, species, Proteus, Pasteurella, species, and Clostridia.

Flohans 20% is indicated for treatment of diseases affecting respiratory and gastrointestinal system, or any other systemic bacterial infection that might be caused by either Secondary or Primary infection.

Dosage & Administration:

Preventive: 1ml per 4 litre of drinking water for 3-5 days.

Treatment: 1ml per 2 litre of drinking water for 3-5 days.



علامات:

بیکٹیریا کے خلیوں میں پروٹین کو بننے سے روکتا ہے۔

یہ دوا مندرجہ ذیل بیکٹیریا کے خلاف انتہائی موثر ہے۔

ای کولائی، سالمونیلہ، ہیملوفیلیا، ہسٹیلوکوکس، اسٹریپٹوکوکس،

پروٹینس، پیٹیجریلا، اور کلوسٹریڈیا۔ اس کے علاوہ ان تمام بیماریوں

کو روکتی ہے جو پھیپھڑوں، نظام ہضم اور جسم کے مختلف حصوں میں

انفیکشن پھیلاتی ہیں۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

مرغیوں کیلئے:

احتیاطی خوراک:

1 ملی لیٹر 4 لیٹر پانی میں سے 3 سے 5 دن تک دیں۔

بطور علاج:

1 ملی لیٹر 2 لیٹر پانی میں سے 3 سے 5 دن تک دیں۔

®

VETCO

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

Hansflor-F

W/S Powder

ہانس فلور-ایف

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

COMPOSITION:

Each gm contains:

Oxytetracycline HCl.....300 mg

Florfenicol.....100 mg


Neomycin sulphate.....150 mg

(As per Innovator's Specifications)

INDICATIONS:

Hansflor-F: Fowl Cholera, E-coli, Fowl Typhoid (Salmonella), Staphylococcus and Streptococcus spp.

Corynebacterium, Campylobacter,



®

VETCO

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

Haemophilus, Mycoplasma, Rickettsia and Chlamydia spp. Gastrointestinal and respiratory infections caused by oxytetracycline, Neomycin & Florfenicol sensitive bacteria in calves, goats &

poultry.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

Prevention:

1gm / 4 liters of drinking water for 3 to 5 days.

Treatment:

1 gm / 2 liters of drinking water for 5 days.

Cattle & Sheep:

1 gm / 10 kg of body weight.

علامات:

فاؤل نامیفا نیڈ، فاؤل کالره، ای۔ کولائی، ہی آرڈی، انتڑیوں کی سوزش، مٹانے کی سوزش اور دیگر مجموعی علامات کیلئے قابل عمل ہے۔

خوراک:

احتیاطی: 1 گرام فی 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک دیں۔

معالجی: 1 گرام فی 2 لیٹر پینے کے پانی میں 5 دن تک دیں۔

مویشی اور بھیڑ، بکری: 1 گرام بلحاظ 10 کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے۔



®

VETCO

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring
Company

SULPAMED-50

W/S Powder

سلیپامیڈ-50

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

COMPOSITION:

Each 100 gm contains

Oxytetracycline HCl.....20 gm


Colistin Sulphate.....24 MIU

Neomycin Sulphate.....20 gm

(As per Innovator's Specification)

INDICATION:

Poultry: CRD, fowl cholera, fowl typhoid, bacterial enteritis, coli-bacillosis, synovitis, omphalitis, septicaemia and early chick mortality.



VETCO®

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

Livestock: Pneumonia, scour, enteritis, listeriosis, early calf-mortality and litospirosis.

DOSAGE:

Poultry:

Amcostin-20

W/S Powder

Prevention: 1 gm in 8 liter of water for 5 days.

Treatment: 1 gm in 4 liter water for 5 days.

علاج:

سی آر ڈی، امی کولائی، آنتوں کی سوزش، فاول کالره اور نامیفا نیڈ کے لئے نہایت موثر ہے۔ چوزوں کی ابتدائی اموات کو روکنے کیلئے انتہائی موثر دوا ہے۔

موبیشیوں کے لئے:

نمونیہ، آنتوں کی سوزش اور نوزائیدہ چھڑوں کی اموات میں اثر پذیر دوا ہے۔

خوراک:

(پولٹری) بیماری سے بچاؤ یا احتیاطی طور پر:


ایک گرام 8 لیٹر پانی میں 5 دن تک لگاتار دیں۔

بیماری کی صورت میں علاج کیلئے:

ایک گرام 4 لیٹر پینے کے مانی میں 5 دن تک استعمال کریں۔

ایمکو سٹن-20 فیصد

پانی میں حل پذیر پاؤڈر



• • •




An Animal Caring Company

COMPOSITION:

Each 1000gm contains
Amoxicillin Trihydrate200gm
Colistin Suphate50 miu
(As per Innovative Specifications)

INDICATIONS:

Highly effective in Entritis, E.coli, coryza, Fowl typhoid and pasteurellosis in poultry. It is indicated in GIT infections, respiratory tract infections, urogenital infections, secondary bacterial infections during viral disease in calves, sheep, goats and poultry.





An Animal Caring Company



DOSAGE & ADMINISTRATION:

ANC-Hans

W/S Powder

لے این سی۔ ہانس

COMPOSITION:

Each 1000gm contains

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

Preventive: 1gm/4 liter of drinking water for 3-5 days.

Treatment: 1gm/2 liter of drinking water for 3-5 days.

علامات:


ایکوسٹن۔ 20 فیصد جانوروں اور مرغیوں میں سٹیفلو کوکسس، سٹرپٹوکوکس ایکولائی، فاول کارہ، فاول ٹائیفائیڈ، معدہ اور آنتریوں کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے خوراک اور طریقہ استعمال:

اختیاطی طور پر:

1 گرام فی 4 لیٹر پینے کے پانی میں 5-7 دن تک دیں۔

بہاری کی صورت میں:

1 گرام فی 2 لیٹر پینے کے پانی میں 5-7 دن تک دیں۔



• • •



An Animal Caring Company

Amoxicillin as trihydrate100gm
Colistin Suphate (B.P).....50gm





An Animal Caring Company

Neomycin Sulphate (B.P).....200gm

(As per Innovative Specifications)

INDICATIONS:

Highly effective in Enteritis, E.coli, coryza, Fowl typhoid and pasteurellosis in poultry. It is indicated in GIT infections, respiratory tract infections, urogenital infections, secondary bacterial infections during viral disease in calves, sheep, goats and poultry.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

Preventive: 1gm/4 liter of drinking water for 3-5 days.

Treatment: 1gm/2 liter of drinking water for 3-5 days.



علامات:

اے این سی۔ ہانس جانوروں اور مرغیوں میں سٹیفیلوکوکس، سٹرپٹوکوکس اکیلوئی، فاول کارلرہ، فاول ٹائیفائیڈ، معدہ اور آنتریوں کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے خوراک اور طریقہ استعمال:

احتیاطی طور پر:

1 گرام فی 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3-5 دن تک دیں۔

بیماری کی صورت میں:

1 گرام فی 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3-5 دن تک دیں۔



سرپرہ



An Animal Caring Company

Hascoli-50 %

W/S Powder

ہس کولی-50 فیصد

Composition:


Each 100 gm contains:

Colistin Sulphate.....50gm (As per Innovative Specifications)

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

Indications:

Colistin sulphate is a polymixin antibiotic that is highly effective against gram negative bacteria. It is poorly absorbed from the gastro intestinal tract after oral administration. Thus offering specific advantages in the treatment and control of gastro intestinal infections, colibacillosis and salmonellosis. It is characterized by its ability to penetrate the cell wall and no drug cross resistance with other antibiotics.



VETCO®

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

Has Coli 50% is indicated in the treatment of general bacterial infections caused by gram

Linc-Hans 44 %

W/S Powder

لنک-ہانس 44 فیصد

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

COMPOSITION:

Each 100gm contains:

Lincomycin HCl Monohydrate44gm

(As per Innovator's Specification)

negative bacteria. It is used to treat gastro intestinal tract infections caused by E-coli, colibacillosis, klebsiella, salmonella, pasteurilla and pseudomonas.

Dosage:

Prevention:

1 gm per 12 liters of drinking water for 5 to 7 days.

Treatment:

1 gm per 8 liters of drinking water for 5 to 7 days.

استعمال:

مریضوں میں آنتوں کی بیماریوں کے علاج اور نمونیا کے لیے ہر 12 لیٹر پانی میں 1 گرام تک استعمال بہترین نتائج کا حامل ہے۔ مریضوں میں گرام منفی بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماریوں ای کولائی، کولی فسیلیوسس، سالمونیا، پاستوریلہ، کلےبسیلا اور سوڈوموناس وغیرہ میں نہایت مفید اور موثر دوا ہے۔

مریضوں کی متعدی بیماریوں میں انتہائی اکیس اور نظام ہاضمہ نظام کو لید اور نظام تنفس میں کامیابی سے استعمال ہونے والی دوا ہے جو تیزی سے جراثیم تک پہنچ کر اثر دکھاتی ہے، جس سے شرح اموات میں تیزی سے کمی آتی ہے۔

خوراک:

احتیاطی: 1 گرام فی 12 لیٹر پینے کے پانی میں 5 سے 7 دن تک استعمال کریں۔

معالجی: (بیماری کے دوران):

1 گرام فی 8 لیٹر پینے کے پانی میں 5 سے 7 دن تک استعمال کریں۔



As a 1 1 365 1 365 1 365



ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

W/S Powder

لنك-هانس 4.4 فيصد

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

COMPOSITION:

Each 100gm contains:


Lincomycin HCl Monohydrate4.4gm

(As per Innovator's Specification)

INDICATIONS:

Linc-Hans 4.4% is indicated to achieve growth improvement in feed intake and egg

production it has strong activity against bacterial infections like streptococcus, staphylococcus, E-coli, Neutrotatic entritis and mycoplasmas.



DOSAGE:

Prevention:

A a e u n t . s

• • • • •

• • • • •

VETCO®

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring
Company

NeoHans-60 %

W/S Powder

نیوہانس-60 فیصد

پانی میں حل پذیر پاؤڈر

COMPOSITION:

Each 100gm contains:

Neomycin Sulphate 60gm

(As per Innovator's Specifications)

INDICATIONS:

VETCO®


ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company

Neo Hans-60% is an antibiotic from the aminoglycoside group with bactericidal activity. It can be easily dissolved in water and stay in a stable solution. It is poorly absorbed from the intestinal tract into the circulatory system. In a low dose it acts bacteriostatic.

Neomycin sulphate is effective against various bacteria causing enteritis and mastitis like Streptococci, Staphylococci, Echerichia coli, Salmonella, Campylobacter, Actinobacillus, Listeria and Proteus.



DOSAGE:

Poultry: 50-100 gram/ 200 liter of drinking water for 3-5 days.

Cow, Buffalo, Horse: 4gm/100 kg body weight for 3-5 days.

Sheep & Goat: 40mg/kg body weight for 3-5 days.

علامات:

نیو ہانس 60 فیصد جانوروں اور مرغیوں میں معدہ اور انتڑیوں کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک:

پولٹری:

50 گرام سے 100 گرام فی 200 لیٹر پانی میں 3 سے 5 دن تک گائے بھینس، گھوڑا:

4 گرام فی 100 کلوگرام جسمانی وزن کیلئے 3-5 دن تک دیں۔

بھیڑ، بکری:

40 ملی گرام فی کلوگرام جسمانی وزن کیلئے 3-5 دن تک دیں۔



د



An Animal Caring
Company

Hans Cycline-50 %

W/S Powder

COMPOSITION:

Each 100gm contains:

Oxytetracycline HCl.....50gm (As
per Innovative Specifications)

ہانس سائیکلین-50 فیصد

پانی میں حل پذیر پاؤڈر


INDICATIONS:

،



An Animal Caring Company

Hans Cycline-50% is highly effective against E.coli, Fowl Cholera, Fowl Typhoid, respiratory and gastro intestinal problems. It is also used for feed intake, growth promoter and egg production.



DOSAGE:

Prevention:

1gm per 8 Liter drinking water 3-5 days.

1 gm 4 liter drinking water 3-5 days.

علامات:

ہانس سائیکلین -50 فیصد، ایکولائی، فاؤل کالرہ،
فاؤل ٹائیفائیڈ، سی آر ڈی، سی سی آر ڈی اور معدہ و آنت
کی بیماریوں کے لیے بے حد موثر ہے۔
مرغیوں میں خوراک کے بہتر استعمال،
انڈوں کی پیداوار بڑھانے اور جسمانی نشوونما بہتر کرنے
کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک و طریقہ استعمال:

احتیاطی خوراک:

1 گرام 8 لیٹر پانی میں 3 سے 5 دن استعمال کریں

بیطور علاج:

1 گرام 4 لیٹر پانی میں 3 سے 5 ن استعمال کریں



،



An Animal Caring Company

Treatment:

MoxHans-60 %

W/S Powder

موکس ہانس۔60 فیصد


پانی میں حل پذیر پاؤڈر

COMPOSITION:

Each 100gm contains
Amoxicillin as trihydrate 60gm
(As per Innovative Specifications)

INDICATIONS:

Highly effective in Entritis, E.coli, coryza, Fowl typhoid and pasteurellosis in poultry. It is indicated in GIT infections, respiratory tract infections, urogenital infections, secondary



،



An Animal Caring Company

bacterial infections during viral disease in calves, sheep, goats and poultry.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

Preventive: 1gm/8 liter of drinking water for 35 days.

Treatment: 1gm/4 liter of drinking water for 3-5 days.

علامات:

موکس ہانس۔ 60 فیصد جانوروں اور مرغیوں میں سٹیفلو کوکس، سٹرپٹوکوکس اکیلوئی، فاول کالرہ، فاول ٹائیفائیڈ، معدہ اور آنتڑیوں کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ جانوروں میں پیشاب کی چھیدہ بیماریوں اور سانس کی بیماریوں کے لئے بھی بے حد مفید ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

اختیاطی طور پر:

1 گرام فی 8 لیٹر پینے کے پانی میں 3-5 دن تک دیں۔

بیماری کی صورت میں:

1 گرام فی 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3-5 دن تک دیں۔





An Animal Caring Company

MENTOVET-12

مینٹو وِٹ۔12

Oral Liquid

اورل لیکویڈ

COMPOSITION:

Each ml contains:

Bromhexine HCL.....10mg

Menthol.....20mg

(As per Innovator's Specification)

INDICATIONS:

Mentovet-12 is highly effective as mucolytic expectorant that increases bronchile secretions and decreases the viscosity due to powerful combination of menthol and bromhexine. Also indicated to treat the symptoms that result from respiratory infections such as difficulty in breathing and sneezing in poultry.

DOSAGE:

Treatment: 1 ml per 2 liters of drinking water for 3 to 5 days.

Prevention: 1 ml per 4 liters of drinking water for 3 to 5 days.



علامات:

مینو وِٹ۔12 نمونیا، کھانسی، گلے سے بلغم کے اخراج، سانس کی بھالی، وائرس سے پیدا ہونے والی سانس کی پیچیدگیوں کیلئے موثر دوا ہے۔
مینو وِٹ۔12 سانس کی دشواری جیسا کہ دمہ، الرجی کے لئے بھی بے حد مفید ہے۔

خوراک:

علاج:

1 ملی لیٹر فی 2 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک استعمال کریں۔

احتیاط:

1 ملی لیٹر فی 4 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 دن تک استعمال کریں۔

VETCO[®]

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



VETCO[®]

ENTERPRISES (Pvt.) Ltd.



An Animal Caring Company



Flat # 6, 2nd Floor, United Center, Murree Road, Shamsabad, Rawalpindi-Pakistan.



051-493501



+92 301 8657525



+92 323 4441525



— Vetcopk1525@gmail.com